

Directives pour la gestion d'urgence de la fièvre ou de la maladie aiguë
chez les enfants présentant une **l'anémie falciforme**

À traiter rapidement!



Atlantic Provinces Pediatric Hematology
Oncology Network
Réseau d'oncologie hématologie pédiatriques des
Provinces atlantiques
(APPHON/ROHPPA)

Date de la version: juin 2017

À traiter rapidement!

Traitement initial d'une septicémie suspectée

Une fièvre ($\geq 38,3$ °C buccale/tympanique ou $\geq 37,8$ °C axillaire)

chez un enfant présentant une asplénie ou une hyposplénie exige une intervention médicale **immédiate** dans l'ordre suivant :

1. Stabiliser l'enfant
2. Faire un pris de sang pour formule sanguine complète (FSC) avec différentielle, lactate et hémoculture STAT dans les **30 minutes** de l'arrivée.
3. Établir un accès vasculaire
4. Débuter les antibiotiques dans les **60 minutes**
 - a. N'attendez pas les résultats de la FSC
 - b. Consultez les **ordonnances pré-imprimées et l'algorithme** pour savoir quoi faire
5. Adressez l'enfant au service des urgences le plus proche car la détérioration clinique peut être soudaine

DÉBUTER LES ANTIBIOTIQUES IMMÉDIATEMENT!

Définitions

La fièvre et / ou la maladie aiguë chez les enfants et les jeunes atteints de maladies falciforme peuvent être *mortelles* et doivent être *traitées rapidement*.

L'infection bactérienne massive est un risque important chez les patients qui n'ont pas de fonction splénique ou de rate absente (asplénie) ou dont une rate dysfonctionnelle (asplénie fonctionnelle/hyposplénie).

Pour une crise de douleur due à l'anémie falciforme ou un syndrome thoracique aigu, consultez le site APPHON/ROHPPA: <http://www.apphon-rohppa.com/fr/guidelines/sickle-cell-guidelines> → Directives sur l'anémie falciforme et ordonnances pré-imprimées

Traitement antibiotique

Pour les patients âgés de > 2 mois :

- Ceftriaxone – 100 mg/kg/jour IV q24h(maximum 2 g/dose)

*Si l'on soupçonne que le patient a une **méningite**, ajoutez :*

- Vancomycine – 50 mg/kg/jour IV q6h(maximum 1 g/dose)

*Si l'on soupçonne que le patient a des **mycoplasmes**, ajoutez :*

- Clarithromycine – 15 mg/kg/jour po BID (maximum 500mg/dose)

Pour les patients âgés de < 2 mois :

- **Voir les ordonnances pré-imprimées pour la fièvre en l'anémie falciforme**

Appeler l'hématologue pédiatrique-oncologue Sur appel au cours de 1 HEURE de présentation pour discuter de la gestion 902-470-8888 ou 1-888-470-5888 (sans frais)

Nom de l'établissement tertiaire: _____

Numéro de téléphone: _____

Pour obtenir de plus amples informations, consultez les directives sur **l'anémie falciforme** sur le site APHON/ROHPPA : <http://www.apphon-rohppa.com/fr/guidelines>

Veuillez envoyer les documents d'évaluation et de traitement par télécopieur au 902-470-7208

Renseignements sur le patient

Nom : _____

DDN : _____ (jj/mm/aaaa)

Diagnostic : _____

Comorbidités : _____

Allergies: _____

Prophylaxie antibiotique : _____

Autres médicaments : _____

Date : _____ (jj/mm/aaaa)

Médecin prescripteur : _____